

80歳までに約 **3** 人に **1** 人が発症<sup>※1</sup>

# 带状疱疹の予防接種

## 带状疱疹について

带状疱疹は水ぼうそうと同じウイルスが原因で水ぼうそうが治った後もウイルスが体内に潜み続ける特徴があります。そのため過去に水ぼうそうに罹ったことのある人は免疫の低下、疲労・ストレスなどでウイルスが再活性化して带状疱疹を発症します。上半身(お腹周り)、顔や目の周りの神経に沿って赤い斑点と水ぶくれが帯状に生じ、夜眠れないほどピリピリとした強い痛みや神経を損傷すると痛みが続く「带状疱疹後神経痛」、その他合併症を引き起こします。特に50代頃より発症率が高くなり、そして約6%の割合で繰り返し発症する場合があります。<sup>※2</sup>



※1 Shiraki K. et al.: Open Forum Infect Dis. 4(1), ofx007, 2017

※2 Shiraki K. et al.: Open Forum Infect Dis. 4(1), ofx007, 2017



## 50歳からのワクチン接種

獲得した免疫(抗体)は、年齢とともに弱まります。50歳以上の人はワクチン接種を受けましょう。

当院は2種類のワクチンを取り扱っております。

ワクチンの種類	発症 予防率	持続期間	接種回数	料 金	副反応
ビケン	50%	5年程度	1回	6,600円	注射部分の痛み、腫れ、倦怠感
シングリックス	97%	9年以上	2回	22,000円/回	注射部分の痛み、強い腫れ、倦怠感、頭痛など

※市町村によって補助金が出る場合がございます。詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。